

金

匱

縣

解

金匱懸解卷十二

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

黃疸

黃疸水旺土濕外感風邪濕鬱爲熱傳於膀胱者也水土合邪法當利水而燥土但高低不同表裏攸判其表在經絡發其汗孔裏在膀胱利其小便高在上脘吐其敗濁低在下脘下其陳莢四路清泄黃疸無餘矣第黃生於土濕濕原於陽虛其小便清白腹滿欲利者是濕寒之黃也濕熱者黃疸之表證也濕寒者黃疸之本色也濕寒之黃仲

景未嘗立法然經濕腸中桂附朮甘諸方具在推而擴之
附子真武茯苓同逆亦何非濕寒之法也讀者變通而化
裁之法不可勝用矣慎勿株守梔子大黃一法以概寒熱
無定之黃蘗也

黃蘗一

寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾
色必黃瘀熱以行

寸口以候三陰寸口脈浮而緩浮則爲表中於風緩則爲
肌膚之痺是爲風痺非中風也風痺於表則四肢苦煩脾

色必黃。瘵熱以行，益脾爲濕土，其色爲黃。脾氣內遏，不得四達，故濕熱爲黃色。外發四肢，秉氣於脾，脾病不能行氣於四肢，故四肢煩生。素問：平人氣象論，溺黃赤，安臥者，黃痺。目黃者，曰黃痺。靈樞論疾診尺：身痛而色微黃，齒垢黃，爪甲上黃，黃痺也。黃痺者，土濕而木鬱，木主五色，入土則化黃。溺者，肝木之疏泄，目者，肝木之開竅，爪甲者，筋之餘，肝木之主司。安臥者，脾之倦，肝木之傷，尅風木不鬱，不成黃痺也。

黃痺二

跌陽脈緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲滿尺
脈浮爲傷腎跌陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀卽眩穀氣不
消口中苦澀濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體
盡黃名曰穀癰。

跌陽脈以候三陽跌陽脈緊而數數則爲熱內熱則消穀
緊則爲寒內寒則不能消穀食卽爲滿尺脈之浮爲風傷
於腎上章寸口脈浮而緩浮則爲寸口關上尺中三部俱浮其尺中之浮乃風傷於腎跌陽脈浮
爲寒傷於脾緊爲腎脈風邪外束其腎家之寒寒水侮土則脾氣受傷脾氣傷於寒故跌陽脈緊也
外風與內寒相搏脾傷不能磨化故食穀則頭暈而目眩

水氣不化中氣脹滿穀氣陳宿不消胃中敗濁化生癰熱
甲木不降是以口眩穀氣陳宿不消胃中敗濁化生癰熱
跌陽脈緊而數數則爲熱熱在胃也緊則爲寒寒在脾也
泄矣而水道阻梗小便不通又無外泄之路則太陰少陰
俱被寒傷然不能內入於臍因而外入於府流於膀胱
膀胱之熱然於周身身體盡黃名曰穀疸胃熱入於膀胱
濕熱蒸於穀疸者胃熱脾寒穀不消之所致也
則病黃疸穀疸者胃熱脾寒穀不消之所致也

黃疸

陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作
穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

此段見傷寒陽明陽明燥土太陰濕土陽旺土燥則脈數陰旺土濕則脈遲陽明病脈遲太陰盛而陽明虛也陽衰濕旺飲食不甘故難以至飽飽則脾不能化中焦鬱滿故心煩而頭眩也土濕則木鬱不能疏泄小便必難濕無泄路而穀氣陳宿此欲作穀瘕雖下之而腹滿如故所以然者以其脈遲而陰盛故也

黃疸四

心中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸。

心中懊懣煩熱不能下食時欲嘔吐名曰酒疸酒之爲性

最動下濕而生上熱醉醒之後往往煩渴飲冷傷其脾陽
从而脾陽頹敗下濕愈滋上熱彌盛生懊憹煩熱嘔吐不
食之證將來必病酒痺醫者去其上焦之濕熱而昧其下
焦之濕寒涼泄不已熱未去而寒愈增土崩陽絕則人亡
矣酒家之病成於飲食之生冷酒家之命殞於藥餌之寒
涼此千古之冤枉而人無知者良可哀也

黃痺五

夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也
酒痺陽敗土濕金鬱於上不能化津木遏於下不能泄水

必小便不利。胃逆而君火不降，則心中熱。脾陷而風木不升，則足下熱。木中孕火，其氣本溫，未陷於水，濕鬱爲熱。肝脈起於足大指，腎脈起於足心，故足下熱也。緣其中氣頽敗，不能升降陰陽故也。

黃疸六

酒疸。心中熱，欲吐者，吐之愈。

酒疸。心中煩，熱欲作嘔吐者，吐之則愈。緣其濕熱鬱蒸，化生敗濁，濁氣薰心，故欲作吐。吐其腐敗，則惡心噦噦止矣。

黃疸七

酒黃疸者，或無熱，靖言了了。腹滿欲吐，鼻燥，其脈浮者，先吐。

之脈沈弦者先下之

酒疸或心中無熱，靖言了了，而腹滿欲吐，此緣上濕而胃逆也。肺金莫降，津液不生，是以鼻燥，肺發於鼻也。其脈浮者，濁瘀在心肺之部，當先吐之。脈沈弦者，濁瘀在肝腎之部，當先下之。以腐敗物阻，心肺不降，是以脈浮。心肺之腎肝不升，故脈沈也。肝腎沈，吐下之後，腐物湧泄，則心肺下降，而腎肝上升矣。

黃疸八

酒疸下之，久久爲黑疸。目青面黑，心中如蝕蒜，暴狀大便正

黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之

酒疸下之敗其脾陽久而寒水侮土變爲黑瘧木主五色入土爲黃入水爲黑白入爲青肝木藏血而華皮膚水土溫燥乙木榮達則五氣調和色不偏見其一色偏呈者一藏抑鬱而木氣不達也下後土敗陽虧水邪上凌木鬱濕土之中則見黃色木鬱寒水之內則見黑色木氣白鬱則見青色肝竅於目目青者肝氣抑鬱自現其色於本經之竅也陽明行身之前自而下項面黑者寒水風木之邪上乘戊土之位也穀入於胃而消於脾從土化氣故大便黃

色正黑者水侮木賊而土敗也土生於火木賊則土負水勝則火熄心中火位而如噉蒜齧寒水滅火金氣無制故辛味見於心家金味辛也不潤而凝不能滋榮皮膚故皮膚枯槁爪之不仁陽虛而不根於下故脈浮弱其色雖黑而黑中微見黃色故知是黃疸所變化也。

黃疸九

額上黑微汗出手足中熱溼暮即發膀胱急小便自利名曰女勞瘵腹如水狀不治

足太陽之經起睛明

在日上

額交巔而後行於背太陽寒

水之氣逆而不降則額見黑色濕氣蒸泄則微汗出于厥
陰之經起胸中而走掌中脈出於勞宮穴在手心中足少陰之
經起小指而走足心脈出於湧泉在足手中熱者少陽相
火之逆也少陽與厥陰爲表裏故熱在手心足中熱者厥
陰風木之陷也乙木生於癸水木陷於水溫氣下鬱故熱
在足心日暮陽衰寒濕下動木火鬱陷是以病發木陷於
水遏抑鼓盪不得上達故膀胱迫急風木疏泄火敗水寒
蟄藏失政故小便自利此名曰女勞瘵女勞之家縱慾傷
精泄其腎肝溫氣水寒木枯脾敗濕作則病黑瘵久而腹

如水狀鼓脹不消則水木爲賊而中氣崩潰不可治也

黃疸十

師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱相得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之。

病黃疸發熱煩喘胸滿口燥何遽至此此以疸病發時原有內熱復以火劫其汗兩熱相合表裏燔蒸肺金受傷故至如此然黃家所以得病從濕得之非從熱得濕鬱則爲熱耳若一身盡發熱而黃肚皮又熱此濕之在裏當下之

也。蓋楊師傳胃中熱則消穀，膈以上皮熱，腸中熱則出黃如糜，膈以下皮熱，此即肚熱，熱在裏之義也。

黃疸十一

脈沈渴欲飲水，小便不利者，皆發黃。

脈沈者，水盛而水陷也。水滯不能疏泄，則小便不利。風燥亡津，則渴欲飲水。濕熱在中而下無泄路，凡有此證，無不發黃。

黃疸十二

腹滿舌痿黃，躁不得睡，屬黃家。

土鬱不運則病腹滿。素問痿論治痿獨取陽明。舌痿黃者。土濕脹滿。陽明上逆。君火不得下降。鬱於戊土之中。火土合邪。濕熱蒸蒸。故舌痿而發黃。黃爲土色。而舌爲心竅也。火不根水。故躁不得睡。此屬黃家。

黃疸十三

黃疸之病。當以十八日爲期。治之十日以上。痿反劇者爲難治。

素問太陰陽明論脾者土也。治中央。常以四時長四藏。各十八日。寄治不得獨主於時也。黃疸。太陰濕土之病。故以

十八日爲期。土氣未敗。治之十日以上。當瘳。反劇者。土敗。不應。常期。故難治。

黃疸十四

瘳而渴者。其瘳難治。瘳而不渴者。其瘳可治。發於陰部。其人必嘔。陽部。其人振寒而發熱也。

瘳而渴者。濕蒸爲熱。濕爲陽虛。而熱爲火盛。泄火則損其陽。補陽則益其火。故爲難治。瘳而不渴者。濕多熱少。故爲可治。發於陰部。其病在裏。濕盛土鬱。胃氣上逆。必作嘔吐。發於陽部。其病在表。濕旺經腧。風寒外襲。必發熱而惡寒。

也

黃疸十五

穀疸之爲病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃爲穀疸茵陳蒿湯主之。

穀疸之病濕盛而風風寒搏其營衛則病寒熱濕土鬱滿不甘飲食食下不消滯氣上逆即頭目眩暈而心胸不安久而穀氣瘀滯化而爲熱熱流膀胱發爲穀疸茵陳利水而除濕祛黃泄熱而清煩也。

茵陳蒿湯

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便常利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去。

黃疸十六

酒黃疸心中懊惱或熱痛梔子大黃湯主之。

酒疸心中懊惱或生熱痛全是濕熱薰衝宮城鬱塞梔子大黃湯梔子有寒清熱而除煩枳實大黃泄滿而溫瘀也
梔子大黃湯

梔子 十四枚 香豉 一升 枳實 五枚 大黃 二兩

右四味以水六升煮取二升分溫三服

黃疸十八

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之勝眊急少腹滿身重黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時瀉此女勞之病非水也腹滿者難治硝礬散主之

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之緣女勞泄其腎陽水寒土濕乙木過陷不能疏泄水道一感風邪衛氣內閉汗尿不行濕無泄路瘀蒸肌膚而發黃也日晡土旺

之時濕盛發熱而木鬱陽陷故足下當熱而身反惡寒木鬱於水土之內不能上達膀胱迫急少腹滿脹一身盡發黃色而寒水上逆額上獨黑久而土負水勝黃化而黑因作黑痢穀渣不從土化而從水化大便亦黑時時溇泄其腹脹如水之狀此係女勞之病非水也腹脹滿者水木旺而中氣敗證爲難治硝礬散硝石湯熱瘀而泄木礬石收濕淫而泄水也。

硝礬散

硝石

礬石

等分燒

右二味爲散。大麥粥汁和服。方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。

黃輝十八

黃輝病茵陳五苓散主之。

黃輝病。水澀土濕。茵陳泄濕而清熱。五苓利水而燥土也。茵陳五苓散。

茵陳蒿末十分
五苓散五分

右二味。和先食飲服。方寸匕。日三服。

黃輝十九

諸黃猪膏髮煎主之

諸黃濕熱癰蒸膀胱癰閉猪膏利水而清熱髮灰泄濕而通癰也

猪膏髮煎

猪膏

半斤亂髮如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便去

黃輝二十

諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝加黃

耆湯主之

方在水氣

諸病黃家皆由濕得膀胱閉癰濕無泄路但當利其小便以泄濕熱茵陳五苓猪膏髮煎之法是也假令脈浮則濕在經絡而不在藏府此當以汗解之宜桂枝加黃耆湯泄其營衛以散濕邪也

黃輝二十一

黃輝腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃硝石湯。

黃輝腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實緣汗孔外泄水道裏熱濕不在經絡而在藏府法當下之治主大

黃硝石湯。大黃硝石泄陽明之濕熱。梔子黃柏清君相之
鬱火也。

大黃硝石湯

大黃

四兩

硝石

四兩

梔子

十五枚

黃柏

四兩

右四味以水六升煮取二升去滓內硝石更煮取一升
頓服。

黃輝二十二

黃輝病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱出必噦
噦者小半夏湯主之。方在
痰飲

黃輝病小便清白不變黃赤之色兼自欲利是脾腎濕寒而清氣下陷也腹滿而喘是肺腎寒濕而濁氣上逆也此雖有外熱不可除也熱除土敗寒濕愈增腎氣更逆必發噦噦噦者宜小半夏湯半夏生薑降衝逆而止嘔噦溫寒濕而行鬱滿也。

黃輝二十三

諸黃腹痛而嘔者宜小柴胡湯。

方在嘔吐。

諸黃腹痛而嘔者甲木之賊戊土而胃氣上逆也宜小柴胡湯柴胡黃芩疏甲木而泄相火參甘大棗培已上而補

中氣。生姜半夏降逆氣而止嘔吐也。

金匱懸解卷十三

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

嘔吐噦下利

嘔噦者陽明胃病也。下利者太陰脾病也。胃以下行為順，胃氣上逆則為嘔噦。脾以上行為順，脾氣下陷則為下利。總以中氣之不治也。中氣者，升降脾胃之樞機。樞機不利，則升降失職，而吐利乃作。此中多挾木邪，以木鬱則尅土，甲木逆於上，則胃氣逆而為吐；乙木賊於下，則脾氣陷而為利。補土疏木，乃吐利之定法。土旺而木達，膽胃降則嘔

止肝脾升則利止矣。

嘔吐一

問曰。病人脈數。數爲熱。當消穀引飲。而反吐者。何也。師曰。以發其汗。令陽氣微。膈氣虛。脈乃數。數爲客熱。不能消穀。胃中虛冷。故也。

此段見傷寒太陽篇。汗多亡陽。濁氣上逆。是以嘔吐。陽不歸根。客居膈上。息道短促。是以脈數。膈上雖熱。胃中則是虛冷。虛冷則水穀不消。而病嘔吐也。

嘔吐二

跌陽脈浮而濇。浮則爲虛。虛則傷脾。脾傷則不磨。朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈緊而濇。其病難治。

跌陽者。陽明胃氣之所變現也。動脈則足趺上之衝陽。故曰跌陽。陽明胃氣以下行爲順。脈不應見。浮緊浮則胃氣之虛而不降也。胃虛而上逆。則脾虛而下陷。陷則脾傷。脾傷不能磨化水穀。故朝食而暮吐。暮食而朝吐。宿穀不化。名曰胃反。胃反者。飲食倒上。是反順而爲逆也。緊濇者。血寒而陽陷也。脾敗不磨。脈見緊濇。水冰地坼。微陽淪敗。陷而不升。故爲難治。

嘔吐三

脈弦者。虛也。胃氣無餘。朝食暮吐。變爲胃反。寒在於上。醫反下之。令脈反弦。故名曰虛。

肝膽脈弦者。小鬱尅土。胃陽之虛也。胃氣無餘。不能消穀。朝食暮吐。變爲反胃。宗氣衰微。寒在於上。醫反下之。令土敗木賊。脈反見弦。故名曰虛也。

嘔吐四

寸口脈微而數微則無氣。無氣則營虛。營虛則血不足。血不足則胸中冷。

寸口者。手太陰肺氣所變現也。肺主氣。寸口脈微而數者。肺中宗氣之虛也。水穀之化營氣行於經絡。其大氣之搏而不行者。積於胸中。命曰宗氣。宗氣者。所以貫心肺而行呼吸。營氣之原也。無宗氣。則營氣虛。營虛則血不足。宗氣之根。實本於營血。血藏於肝。而血中之溫氣。則化君火。氣乃君火之降斂者也。營虛血少。不能化火。陽衰於上。故胸中冷。血陰也。而予君火。其性溫煖和煦。後世但言涼血。而不知煖血。誤人多矣。

嘔吐五

先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家本渴今反不渴者心下有支飲故也此屬支飲。

先嘔而後渴者積飲既去而津亡作渴故爲欲解先渴而後嘔者爲水停心下阻隔君火是以作渴渴而飲水爲停水所阻乃復吐出此屬素有積飲之家也嘔家津液失亡本當發渴今嘔後反不渴者以心下有支飲停留所嘔者但是新下之水故也此屬支飲此段見痰飲咳嗽中。

嘔吐六

病人欲吐者不可下之。

病人欲吐者陳宿在上故不可下

嘔吐七

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

此段見傷寒厥陰嘔家而有癰膿當令其膿從嘔去不可降逆止嘔使膿無出路俟其膿盡癰平則嘔吐自愈矣

嘔八

噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

此段見傷寒陽明濁氣上逆則生噦噦噦而腹滿者太陰之清氣不升陽明之濁氣不降也前後二陰必有不利之

部前部不利利其水道後部不利利其穀道前後竅通濁氣下降則滿消而噤止矣。

嘔吐九

胃反嘔吐者大半夏湯主之。

胃反嘔吐者前竅短澁後門乾燥多有糞若羊矢之證蓋手足太陽兩經同氣水穀入胃脾陽消磨散其精華上歸於肺霧氣化津傳於膀胱太陽水道清通穀道滋潤是以小便不澁大便不乾胃反氣逆肺金莫降津液凝滯化生痰涎二陰失滋枯澁燥結故糞若羊矢下竅堵塞濁氣莫

泄逆而上衝故嘔吐不止緣其陽衰土濕中氣頹敗不能腐熟水穀化氣生津以滋腸胃下竅是以飲食不得順下而逆行也大半夏湯人參補中氣之虛白蜜潤小腸之燥半夏降胃氣之逆中氣旺而水穀消下竅開而渣滓降濁氣不升嘔吐自止陰陽別論三陽結謂之膈手足太陽是謂三陽足太陽膀胱結則小便澀手太陽小腸結則大便乾下竅澀結濁氣上逆故食膈而不下總由陽明之陽虛噎膈與反胃頗同反胃之病在胃之下脘噎膈之病兼在胃之上脘上脘氣閉則食不能入下脘氣閉則入而復出

陽明之性陽盛則開陰盛則閉故也

大半夏湯 七十

半夏 二斤 白蜜 一斤 人參 三兩

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮取二升半溫服一升餘分再服。

嘔吐十

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之。

胃反嘔吐而渴欲飲水者濕盛胃逆而火不根水也以戊土上逆降路瘀塞君相二火不得下蟄逆刑辛金是以渴

生茯苓澤瀉湯苓澤桂枝疏木而泄水姜甘白朮降逆而燥土也。

茯苓澤瀉湯 七十一

茯苓 八兩 澤瀉 四兩 桂枝 二兩 生姜 四兩 甘草 二兩

白朮 三兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八合日三服。

嘔吐十一

吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主之。

吐後渴欲得水而貪飲者吐傷胃氣濕動肺逆鬱生上熱
表裏無降泄之路文蛤湯甘草大棗補土而益脾精石膏
文蛤清金而泄濕熱杏姜利氣而降逆麻黃發表而達鬱
也。

文蛤湯 七十一

文蛤 五兩 麻黃 三兩 生姜 三兩 石膏 五兩 甘草 三兩

大棗 十二枚 杏仁 五十枚

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出即愈

嘔吐十二

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之
病在膈上嘔吐之後而思水飲是病去而津亡也其病當
解宜急與之水以益津液思水者痰飲雖去而土濕猶在
渴欲飲水恐其復致停痰猪苓散二苓白朮泄濕而燥土
最爲相宜也

猪苓散 七十三

猪苓

茯苓

白朮

等分

右三味杵爲散飲服方寸匕日三服

嘔吐十三

食已即吐者大黃甘草湯主之。

食已即吐者胃之上口必有濕熱痰塞大黃甘草湯大黃
泄其鬱熱甘草補其中氣也

大黃甘草湯 七十四

大黃 四兩 甘草 一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服。

嘔吐十四

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之
此段見傷寒厥陰嘔而脈弱胃氣之虛小便復利腎氣之

虛腎司二便寒則膀胱失約故小便自利裏陽虛敗加以身熱而見厥逆者

陰盛於內而微陽外格故為難治宜四逆湯以回裏陽也

四逆湯 七十五

甘草二兩炙乾薑兩半附子一枚生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人

可大附子一枚乾薑三兩

嘔吐十五

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之方見痰飲

嘔吐而穀不得下者胃氣上逆潯陰不降也小半夏湯半

夏生、姜降逆氣而驅濁陰也。

嘔吐十六

嘔而發熱者，小柴胡湯主之。

此段見傷寒少陽嘔者，膽木之迫胃土。甲木從相火化氣，相火鬱升，是以發熱。小柴胡湯，參甘大棗，補胃土而益中氣。柴胡、黃芩，疏甲木而清相火。生薑、半夏，降濁而止嘔也。

小柴胡湯 七十六

柴胡 八兩

黃芩 三兩

半夏 半斤

生薑 三兩

人參 三兩

甘草 三兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。

嘔吐十七

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之。

寒邪衝激則腸中雷鳴。膈胃升鬱則心下痞硬。心痞則火無降路必生土熱。半夏瀉心湯黃芩黃連清上而泄火。姜甘參粳溫中而補土。半夏降逆而止嘔也。

半夏瀉心湯 七十七

半夏八兩洗 黃芩三兩 黃連一兩 乾姜三兩 人參三兩

甘草炙三兩 大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服。

嘔吐十八

嘔而胸滿者吳茱萸湯主之。

嘔而胸滿者中氣虛寒膽胃泛升濁陰逆填塞於膈上也。吳茱萸湯人參大棗補中而培土茱萸生姜溫胃而降逆也。

吳茱萸湯

吳茱萸一升 人參三兩 大棗十二枚 生姜六兩

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服。

嘔吐十九

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之。

此段見傷寒厥陰胃氣上逆濁氣翻騰則生乾嘔肺氣鬱阻津液凝滯則生涎沫濁氣升填頭上壅塞則苦頭痛肺胃上逆根緣中下之虛寒宜吳茱萸湯溫補中脘而降逆氣也。

嘔吐二十

乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之。

乾嘔吐逆吐涎沫胃寒而氣逆也半夏乾姜散半夏降其逆氣乾姜溫其中寒也。

半夏乾姜散 七十九

半夏 乾姜 等分

右二味杵爲散取方寸匕漿水升半煎取七合頓服

嘔吐二十一

乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之。

乾嘔而利者中木之賊戊土胃氣鬱遏不能容納水穀故

下爲瀉利而上爲乾嘔黃芩加半夏生薑湯甘草大棗補中氣而益脾精黃芩芍藥清甲木而泄相火半夏生薑降胃逆而止嘔吐也

黃芩加半夏生薑湯

黃芩

三兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

生薑

三兩

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

嘔吐二十二

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤然無

奈者生薑半夏湯主之

有物無聲曰吐有聲無物曰嘔有物有聲曰噦

胸中似喘似嘔似噦又復不喘不嘔不噦微心中憤憤然煩亂而無奈者胃氣上逆濁陰翻騰溫溫泛泛心緒作惡之象也生薑半夏湯降逆氣而驅濁陰也。

生薑半夏湯

八十一

此即小半夏湯而分兩不同。

生薑汁

一升 半夏 半斤

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半少冷分四服日三服夜一。嘔止停後服。

嘔吐二十三

乾嘔噦者手足厥者橘皮湯主之。

乾嘔噦者胃氣上逆濁氣湧泛也肺氣阻滯鬱生痰涎逆抑清陽不得四布故手足厥逆橘皮湯橘皮生薑降衝逆而行瘀濁也

橘皮湯 八十二

橘皮 四兩
生薑 八兩

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈。

噦逆二十四

噦逆者橘皮竹茹湯主之。

噦逆者中虛而胃逆也橘皮竹茹湯參甘大棗補中而培土橘姜竹茹降逆而止嘔也

橘皮竹茹湯

橘皮二斤竹茹二升生薑半斤人參一兩甘草五兩

大棗

三十枚

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

下利一

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

此段見傷寒太陰下利清穀脾陽陷敗雖有太陽表證不可攻之攻之汗出陽亡清陽愈陷濁陰愈逆必生脹滿。

下利二

下利氣失者當利其小便。

下利而失氣者濕盛而氣滯也當利其小便以滲濕邪。

下利三

夫六府氣絕於外者手足寒。上氣脚縮五臟氣絕於內者利不禁。下甚者手足不仁。

六府爲陽其位在外六府氣絕於外者手足寒冷喘促而

上氣蹇卧而脚縮也。五藏爲陰其位在內。五藏氣絕於內者。下利不禁下甚者。神氣敗泄而手足不仁。六府以胃爲主。五藏以脾爲主。脾胃同主四肢。故病皆見於手足也。

下利四

下利後脈絕手足厥冷。晬時脈還手足溫者生。脈不還者死。

晬子對切說文周年也。一日晬時者周時也。

此段見傷寒厥陰。利後脈絕手足厥冷。陽氣敗泄危亡在。目若晬時脈還手足溫者。陽氣來復可以回生。脈不還者。陽氣不復死無日矣。

下利五

下利手足厥冷無脈者，或之不溫，若脈不還，反微喘者死。此段見傷寒厥陰下利，厥冷無脈，或之不溫，與脈不還是純陰無陽而反微喘者，則氣不歸根，必死無疑也。

下利六

少陰負趺陽者，爲順也。

少陰腎脈，趺陽胃脈。胃土本尅腎水，而水盛反得侮土，以土生於火，而火尅於水，火盛則土能尅水，而少陰負，火敗則水反侮土，而趺陽負。凡病皆水勝而土負，土勝而水負。

者甚少也。水勝則死，土勝則生。故少陰以負趺陽爲順。仲景脈法，唐後無傳。庸工下土，開滋陰補水之門，誤世殃民，禍流千載。今海內醫書，連床累架，皆徐世勳作，無賴賊時逢人輒殺者也。俗子誦之以害生靈，醫如猛虎，人如孤豚，誠足悲傷，不可說也。

下利七

下利脈沈弦者，下重。脈大者，爲未止。脈微弱數者，爲欲自止，雖發熱不死。

此段見傷寒厥陰。下利脈沈而弦者，水寒木陷，必主下重。

設脈大者是利亡肝脾之陽木賊土敗利爲未止若脈微
弱數者是脾陽欲復肝邪將退爲欲自止雖外見發熱然
納將內斂不至死也。

下利八

下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱
汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也。

此段見傷寒厥陰下利而脈沈遲藏陰盛而府陽虛也乃
其人面色少赤身有微熱者是微陽欲復爲陰邪所遏鬱
於皮膚而不能透發也然陽鬱欲發必不終陷頃當衝透

羣陰汗出而解。但微陽孤弱。未能遽出重圍。難免鬱胃昏迷。而後外達皮毛耳。方其鬱胃之時。病人必當微厥。所以然者。其而之少。赤是謂戴陽。戴陽者。陽根微弱而下虛故也。

下利九

下利有微熱而渴。脈弱者。令自愈。

此段見傷寒厥陰。下利有微熱而渴。是陽復矣。脈弱則木邪欲退。故令自愈。

下利十

下利脈反弦發熱自汗者愈

下利脈沈而弦者水寒而木陷也。今弦而不沈，是乙木有升達之意，再見發熱自汗，則下陷之陽已升於上，故愈。

下利十一

下利脈數有微熱汗出，令自愈。設脈緊爲未解。

此段見傷寒厥陰下利脈數而有微熱，陽欲復也。汗出則陽氣外達，故令自愈。設脈復緊，則陰邪閉束，陽陷而不升，爲未解也。

下利十二

下利脈數而渴者令自愈。設不瘥，必固膿血，以有熱故也。

清說文

則清也

此段見傷寒厥陰。下利脈數而渴者，陽已復矣，故令自愈。設利不瘥，必固膿血，以其陽復之過而有餘熱，以傷陰也。

下利十三

下利寸脈反浮數，尺中自濇者，必固膿血。

此段見傷寒厥陰。下利而寸脈反見浮數，是陽復而上盛；尺中自濇者，是陰退而下虛也。陽盛必俯侵陰位，鬱蒸營分而固膿血也。

下利十四

下利腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表，溫裏宜四逆湯，攻表宜桂枝湯。

此段見傷寒太陰下利而腹脹滿，是太陰腹滿自利之症也。其身疼痛，則是太陽表症。是當先溫其裏，乃攻其表。溫裏宜四逆湯，以驅其寒；攻表宜桂枝湯，以驅其風。裏溫而表攻，則汗出，不慮其陽亡矣。

桂枝湯

桂枝

三兩 芍藥 三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

生薑 三兩

去皮

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服
一升餘法詳傷寒太陽篇

下利十五

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之。

下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕是少陰通脈四
逆證而厥陰風木疏洩故有汗出之證亦宜通脈四逆溫
藏寒而通經脈也此段見傷寒厥陰詳閱傷寒少陰厥陰
二篇此段之義乃明。

通脈四逆湯

入十五

此卽四逆湯而分兩不同

甘草

二兩

乾姜

三兩

強人

附子

一枚

頂大

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服。

下利十六

氣利訶黎勒散主之

氣利如前法所謂下利氣也以肝脾濕陷土氣鬱塞木遏風動疏洩不藏而為下利利而隧道梗澁氣塊墮鳴而不條暢是謂氣利訶黎勒散行氣滯而收滑陷也

訶黎勒散

八十六

訶黎勒

十枚

右一味爲散粥飯和頓服

下利十七

下利肺痛紫參湯主之。

肺與大腸爲表裏陽陷而利作則肺逆而痛生而肺腸之失位緣中氣之不治脾土不升而後陽陷胃土不降而後肺逆紫參湯甘草補中而緩急紫參清金而破瘀瘀開而氣調各復肺腸升降之舊則痛定而利止矣

紫參湯

八十七

紫參

半斤

甘草

三兩

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升
半分溫三服。

下利十八

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也梔子豉湯主之

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也梔子豉湯主之

此段見傷寒厥陰利後陽泄不應生煩乃更煩者是陽復
而有內熱也承氣證之煩心下鞭滿是謂實煩若按之心
下濡者是謂虛煩緣陽復熱升薰蒸肺津而化涎沫心氣
鬱阻是以煩生宜梔子豉湯吐其痰濁以清煩熱也。

梔子豉湯

梔子

十四枚

香豉

四合

右二味以水四升先煮梔子取二升半內豉煮取一升半去滓分二服進一服得吐即止。

下利十九

下利譫語者有燥屎也。小承氣湯主之。

此段見傷寒厥陰。下利譫語者是膽火傳於胃土。胃熱而有燥屎也。宜小承氣湯下其燥屎以泄胃燥。此下大承氣證。四章皆少陰之負趺陽下利之順證也。

小承氣湯

大黃

四兩

枳實

三枚

厚樸

三兩

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服得利則止。

下利二十

下利三部脈皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯。

此段見傷寒可下中

在汗下宜忌篇內。

寸大於關關大於尺人之

常也是以三部脈不平三部皆平是乙木鬱於尺中不能上達故尺與關平甲木鬱於關上不能下達故關與寸平

乙木陷則膽下脹甲木逆則心下堅若按之心下堅者是甲木之逆也戊土被迫府不能容故見下利宜大承氣湯急下之以清胃府之鬱熱也。

下利二十一

下利脈遲而滑者實也利未欲止宜下之宜大承氣湯此段見傷寒可下中宿食在中阻其表氣而鬱其裏氣故外滑而內遲裏氣鬱阻肝脾不升故利未欲止。

下利二十二

下利脈反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯

此段見傷寒可下中宿食在中。鬱格陽氣。不交於陰。無復陰氣之翕聚。是以脈滑。

下利二十三

下利已瘥。至其年月日時復發者。其病不盡。故也。當下之。宜大承氣湯。

此段見傷寒可下中。下利瘥後。至其從前病起之期。而又發。以病根不盡。故也。當下之。以絕其根。

下利二十四

熱利下重者。白頭翁湯主之。

此段見傷寒厥陰肝氣遏陷，鬱生下熱，魄門重墜者，宜白頭翁湯。白頭翁，清少陽之相火，黃連，清少陰之君火，黃蘗，秦皮，泄厥陰之濕熱也。

白頭翁湯

白頭翁

三兩

黃連

三兩

黃蘗

三兩

秦皮

三兩

右四味，以水七升，煮取二升，去滓，溫服一升，不愈，更服。

下利二十五

下利，便膿血者，桃花湯主之。

此段見傷寒少陰，久利不止，木鬱血陷，寒濕腐敗，風木搖

剝故便膿血桃花湯粳米補土而泄濕乾姜溫中而驅寒
石脂斂腸而固脫也。

桃花湯 九十一

乾姜 一兩 粳米 一升 赤石脂 一斤 一半剉末

右三味以水七升煮米熟去滓溫服七合內石脂末方
寸七日三服若一服愈餘勿服。

附方

外臺黃芩湯

治乾嘔下利

黃芩

三兩

桂枝

一兩

人參

三兩

大棗

十二枚

乾姜

三兩

半夏

半斤

右六味以水七升煮取三升分溫三服

金匱懸解卷十四

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

痰飲咳嗽

痰飲咳嗽者肺腎之病也而根原於土虛蓋化水者氣也其職在肺化氣者水也其職在腎陽衰土濕則肺失清降而氣不化水腎失溫升而水不化氣於是痰飲作矣痰飲濁痰肺氣不布隔礙壅阻於是咳嗽生焉治咳嗽者去其痰飲治痰飲者倍其土氣倍土氣者疏木而泄水緣水侮木賊中氣濕寒此痰飲咳嗽所由來也然則苓桂朮甘實

爲痰飲主方。自此而化裁之。溫涼補泄。意良法周。雖百應而不一。致實同歸而非殊途也。後世庸工。凡臨咳嗽。必用清潤。至於滋濕伐陽。茫然不知。至久而土崩人亡。未有幸脫者。百試不驗。而千古皆同。此輩心不可鑒也。

痰飲一

問曰。夫飲有四。何謂也。師曰。有痰飲。有懸飲。有溢飲。有支飲。痰飲之處所不同。名目亦殊。義詳下章。

痰飲二

問曰。四飲何以爲異。師曰。其人素盛。今瘦水走腸間。漚漚有

謂之痰飲飲後水流在脇下咳嗽引痛謂之懸飲飲水流
行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼痛謂之溢飲咳逆倚
息氣短不得臥其形如腫謂之支飲

其人素日肌肉豐盛今忽瘦削此由脾虛不能化穀食宿
水停肌肉不生也水走腸間漚漚有聲如此謂之痰飲飲
之行走於心下小腸之間者也飲後水流脇下咳嗽鼓動
牽引作痛如此謂之懸飲飲之空懸於肝膈之經者也飲
水流行歸於四肢當化汗外泄而不得汗出水浸肢節身
體疼痛如此謂之溢飲飲之流溢於四末者也咳嗽氣逆

倚物布息氣道短促不得眠臥營衛鬱迫其形如腫如此謂之支飲飲之支結於膈經而傷及肺藏者也

支飲或左或右偏而不正如樹木之枝在本幹之傍在左則右倚物息在右則左倚物息以足少陽之經下胸貫膈而循脇位在胸側水飲阻隔膈經不降逆衝肺部肺無布息之地故咳嗽不降也

痰飲三

水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿墜而痛水在腎心下悸水在心火敗水凌瀦陰填塞心下堅痛動築氣息短促惡水不欲飲水在肺氣滯津凝吐涎沫而欲飲水水在脾陽

衰濕旺少氣而身重水在肝經氣迫急脇下支結滿嘔
而振動鼓衝作痛水在腎木鬱風搖心下動悸蓋飲食入
胃脾陽蒸動化爲精氣上歸於肺肺金清和將此精氣散
布於五藏六府十二經絡之中而經絡藏府皆得受氣氣
降則化水水升又化氣水之在上氣方化而未盛故氣多
而水少其象如霧氣之在下水方化而未盛故水多而氣
少其形如瀝在上之氣有清有濁清者化而爲神氣內歸
於心肺濁者外泄而爲汗在下之水有精有粗精者化而
爲精血內歸於腎肝粗者外滲而爲溺至於脾胃濕盛而

陽虛則氣水不化凝而爲痰飲。痰者氣不化水。薰蒸於上而凝結者也。故其質厚。飲者水不化氣。淫泆於下而停痰者也。故其質薄。痰飲之作。雖由於肺腎之陽虛。而實緣於脾胃之濕盛。後世庸工。乃有濕痰燥痰之說。不通矣。

痰飲四

夫心下有留飲。其人背寒冷如掌大。

心下火位而留飲居之。是寒水之凌君火也。太陽寒水之經行身之背。其人背後寒冷。正對心位。其大如掌也。留飲卽痰飲之停留者。上自心下。下至小腸。停留不散。是謂諸

飲之宗如水木之源本也自此而畱於脇下則爲懸飲歸於四肢則爲溢飲結於胸旁則爲支飲是謂諸飲之支如水木之枝派也

痰飲五

畱飲者脇下痛引缺盆咳嗽則轉甚

足少陽之經自缺盆而入脇裏足厥陰之經自少腹而布脇肋脇下痛引缺盆者飲阻少陽之經經氣不舒故痛引缺盆咳嗽則經脈振動是以痛甚此飲之畱於脇下而在肝膽之經者所謂懸飲也

痰飲六

胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛

飲阻竅隧肺無降路津液凝滯故短氣而渴濕流關節故四肢歷節煩痛此飲之自胸膈而流四肢者所謂溢飲也

痰飲七

脈沈者有留飲。

火浮水沈自然之性也

痰飲八

膈上病痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振

振身喘劇必有伏飲。

膈上痰飲阻礙肺氣壅滿喘促咳嗽是土濕而胃逆也。一日痰氣上湧嘔吐發作胃氣逆升則太陽不降太陽寒水之經氣鬱遏營衛易位則發熱而惡寒。若陰東其衛中之陽是以發熱惡寒太陽行身之背逆而不降經氣壅迫故脊背痛胃逆則脾陷肝木抑遏陷於水位是以腰痛。腎位於腰肝竅於目腎主五液入肝爲泪木鬱風動肝液升泄故目泪自出風木搖動故振振而喘劇如此必有伏飲緣飲伏濕旺土木鬱鬱是以見證如此。

痰飲九

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後裏虛脈偏弦者飲也病人陽虛濕旺火升作渴飲水一多不能消化水阻肺氣必生喘滿凡土虛食少而飲水多者水停心下鬱其水氣甚者木鬱風動則生瞤悸微者肺金阻隔必苦短氣水旺木鬱其脈必弦弦爲木氣應見於左關若兩關雙弦者是水寒土濕木氣不達乙木鬱於左關而不升甲木鬱於右關而不降此皆大下後之虛脈若一手偏弦者此必飲之

偏在一方鬱其木氣也蓋飲泛土濕木氣必鬱生氣不達故見弦象在左偏弦者飲在脾土在右偏弦者飲在胃土也雙弦即偏弦之重者從則偏弦甚則雙弦實同原也

痰飲十

脈弦數有寒飲冬夏難治

弦數者少陽甲木不降相火逆升其下必有寒飲鬱格冬時水旺下寒陽氣不升夏而水衰然相火升瀉下寒愈劇皆難治也

痰飲十一

肺飲不弦但苦喘短氣

肺病痰飲金能勝木故脈不弦但苦痰飲阻咳喘促短氣耳

痰飲十二

支飲亦喘而不能臥加短氣其脈平也

支飲亦飲之偏結於肺部者故喘不能臥加以短氣其脈亦平而不弦也

痰飲十三

脈浮而細滑傷飲

水飲在中鬱格陽氣并浮不歸故如循貫珠累累聯屬流
利不傳其診曰滑而其中實扞格之象水旺陰盛是以脈
細。

痰飲十四

病痰飲者當以溫藥和之

痰飲水寒土濕火涼金寒精氣堙鬱所作當以溫藥和之
寒消濕化自然渙解蓋土不得火濕氣滋生此痰飲化生
之原也土濕則上不生金痰凝於心胸下不制水飲聚於
腸胃肺冷故氣不化水薰蒸而爲痰腎寒故水不化氣停

痰而爲飲是以溫也。

痰飲十五

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之。

心下有痰飲停於胃口。土濕木鬱膽經其降故胸脇偏支
脹滿。目珠暈眩以君相同氣。甲木失根君相飛騰神魂浮
蕩無所歸宿是以發眩。目者神魂之開竅故眩見於目。苓
桂朮甘湯朮甘補中而燥土。苓桂泄水而疏木也。

苓桂朮甘湯

茯苓

四兩

桂枝

三兩

白朮

三兩

甘草

二兩

炙

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

痰飲十六

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦

主之

方在消渴

微飲阻膈肺金不降是以短氣此緣土濕木鬱不能泄水當從小便去其水飲去而土燥則肺飲而氣降矣苓桂朮甘湯朮甘補中而燥土苓桂泄水而疏木可以主之腎氣丸丹地澤苓清風而泄濕附桂茱萸煖水而榮木亦可
以主之也

痰飲十七

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

留飲在下故脈伏而欲自利若利反捷快是留飲下行腸胃滋濡也雖水隨利下心下猶續續堅滿以水下未盡濁陰不得遽消然已非從前痞結之象此爲留飲欲去故稍覺鬆軟也甘遂半夏湯甘遂半夏泄水而滌飲甘草芍藥培土而泄木蜂蜜滑腸而行水也

甘遂半夏湯

甘遂大者三枚半夏十二枚以水一升煮取半升去滓芍藥五枚甘草一枚炙

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤合藥汁煎取八合頓服之

痰飲十八

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒薤黃丸主之

腸間有水阻遏中氣升降不行是以腹滿君和逆升故口舌乾燥已椒薤黃丸防已椒目泄濕而行水葶薤大黃瀉流而決壅也

已椒薤黃丸

防已

椒目

葶藶熬

大黃各二兩

右四味末之。蜜丸。如梧子大。先食飲服。一九日三服。稍增。口中有津液。渴者加芒硝半兩。

痰飲十九

脈沈而弦者。懸飲。內痛。病懸飲者。十棗湯主之。

水寒木鬱。則脈沈而弦。法當懸飲。在脇咳唾引痛。病懸飲者。木旺土虛。不能行水。宜扶土而泄水。十棗湯芫遂大戟決渠而泄水飲。大棗補土而保脾精也。

十棗湯九十五

芫花熬

甘遂

大戟各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢匕平旦溫服之不下者明日更加半錢匕得快利後糜粥自養痰飲二十

病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之

水歸四肢當汗不汗而成溢飲病溢飲者當發其汗其陽氣鬱阻而肺熱者宜大青龍湯石膏麻桂清金而泄督衛杏仁生姜利肺而泄逆氣甘草大棗培土而補脾精也其

陰氣衝逆而肺寒者宜小青龍湯麻桂芍藥發表而泄營衛甘草半夏補中而降胃氣姜辛五味溫肺而下衝逆也大青龍湯

麻黃

六兩

桂枝

二兩

石膏

如雞子大

杏仁

四十枚

生姜

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯

麻黃

三兩

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘草

三兩

半夏

半升

細辛三兩 乾姜三兩 五味子半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

痰飲二十一

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日復發復與之不愈者宜木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之土濕胃逆不能行水故停飲胸膈阻隔肺氣喘促壅滿膈胃填塞用木其降故盤結胃口心下痞堅水旺木鬱不能

外華故面色黧黑其脈沈緊木防已湯人參桂枝補中而
疏木防已石膏泄水而清金也邪虛者病在膈間得之卽
愈邪實者土濕木鬱而生下熱暫時雖愈三日復發復與
此湯不愈者宜木防已湯去石膏之清上加茯苓以泄下
濕芒硝以清下熱也其面色黧黑者靈樞經脈足少陽厥
陰之經病則面塵脫色蓋木主五色入心爲赤入腎爲黑
以肝木藏血而華色木旺則陽火發露而光華木枯則陰
水壅埋而晦黑木者水母而子火火明而水黯故也得之
數十日醫吐下而不愈者支飲粘痰濕熱纏綿非用防已

石膏不能泄也。燔者三日復發以濕熱在下。病根伏留而不去也。

木防已湯

防已

三兩

石膏雞子大十二枚

人參

四兩

桂枝三兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服。

木防已去石膏加茯苓芒硝湯

防已

三兩

人參

四兩

桂枝

三兩

茯苓

四兩

芒硝

三合

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則愈。

痰飲二十二

假令瘦人。臍下有悸。吐涎沫而頭眩。此水也。五苓散主之。
瘦人氣弱。不能消水。水停木鬱。風動根搖。故臍下振悸。肺
氣不降。津液淫蒸。故湧吐涎沫。君相失根。神魂旋轉。故頭
冒眩暈。此緣水泛而土濕。五苓散。二苓澤泄。利水而泄濕。
白朮桂枝。燥土而疏木也。

五苓散

茯苓十八銖 猪苓十八銖 澤泄六銖 白朮十八銖 桂枝半兩

右五味。爲末。白飲服方寸匕。日三服。多服暖水。汗出愈。

痰飲二十三

卒嘔吐心下痞膈間有水氣眩悸者小半夏加茯苓湯主之
卒然嘔吐心下痞悶膈間有水頭眩心悸者小半夏加扶
苓湯半夏生姜降逆而止嘔茯苓泄水而消滿也

小半夏加茯苓湯

半夏一升 生姜半斤 茯苓四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

痰飲二十四

心下有支飲其人苦冒眩澤泄湯主之

飲停心下陽不歸根并浮旋轉則生冒眩此由土敗水侮故支飲上停澤泄湯白朮補中而燥土澤泄利水而排飲也

澤泄湯

澤泄 五兩
白朮 二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服

痰飲二十五

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

嘔家津液燥動本當發渴渴者爲飲去而欲解也今嘔吐
之後反不作渴此心下有支飲隔阻君相之火逆刑肺金
是以作渴渴而飲水不能消受是以作嘔新水雖吐而支
飲未去是以嘔後不渴小半夏湯半夏生薑降衝逆而排
水飲也

小半夏湯

半夏一升 生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

痰飲二十六

先渴後嘔爲水停心下。此屬飲家。小半夏加茯苓湯主之。
水停心下。火升作渴。飲而新水又停。是以作嘔。

痰飲二十七

支飲胸滿者。厚樸大黃湯主之。

支飲居膈肺之部。清氣鬱阻。胸膈壅滿。此由胃土埋塞。絕其降路也。厚樸大黃湯。枳朴降逆而消滿。大黃泄胃而通瘀也。

厚樸大黃湯

厚樸 一尺
枳實 四枚
大黃 六兩

右三味以水五升煮取二升分溫再服

痰飲二十八

支飲不得息葶藶大棗泄肺湯主之

支飲壅阻肺氣不得喘息葶藶大棗泄肺湯葶藶泄飲而利肺氣大棗保土而補脾精也

湯方見肺癰

痰飲咳嗽二十九

欬家其脈弦爲有水十棗湯主之

欬家脈弦此爲有水緣土濕木鬱是以脈弦疏泄不行是

以有水宜十棗湯補土而泄水也。

痰飲咳嗽三十

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日或一歲宜十棗湯。

欬煩胸痛者支飲阻膈膽肺不降也其病雖久而支飲未去猶宜十棗湯也。

痰飲咳嗽三十一

人咳數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦胃其人本有支飲在胸中故也治屬飲家。

久嗽數歲是肺胃之常逆也其脈弱者土金未敗猶爲可
治實大數者肺胃上逆陽氣絕根土敗於甲木金敗於相
火是以死也其脈虛者必苦冒以其人本有支飲在胸中
格其陽氣故也治法屬之飲家

痰飲咳嗽三十二

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之

欬嗽氣逆倚物布息不得眠臥此支飲在胸膈氣阻而不
降也小青龍湯麻黃桂芍發汗而泄水五味薑辛下氣而
止欬甘草半夏補中而降逆也

痰飲咳嗽三十三

青龍湯汗已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復胃者與茯苓桂枝甘草五味湯治其氣衝

青龍湯服下之後若多唾口燥寸脈沈而尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽是汗後亡陽而風木鬱衝也傷寒汗後陽亡土濕水寒木鬱風動則發奔豚此亦奔豚之大意也多唾口燥者風木耗精而肺氣上薰也寸沈而尺微上下之陽俱虛也手足厥逆土敗而四肢失溫也氣從少

腹上衝胸咽風木之上奔也其面翕然如醉狀因復下流
陰股陽明循面下行風木鬱衝陽明逆行故面熱升匕而
降則流陰股手足痺者汗泄血中溫氣經絡閉塞而不行
也小便難者土濕木鬱不能疏泄也時復冒者飲阻陽氣
升浮無根也此宜與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝茯
苓桂枝泄水而下乙木之衝甘草五味培土而降辛金之
逆也

茯苓五味桂枝甘草湯 百五

茯苓

四兩

桂枝

四兩
去皮

五味子

半斤

甘草

三兩
炙

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服

痰飲咳嗽三十四

衝氣卽低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草湯去桂加乾薑細辛以治其欬滿

服桂苓五味甘草後衝氣卽低而反更欬而胸滿者亡木雖降而辛金更逆也用桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛利肺而降逆以治其欬滿也

苓甘五味薑辛湯百六

茯苓四兩 乾薑三兩 五味子半斤 甘草三兩 細辛三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服
痰飲咳嗽三十五

欬滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當目胃者必嘔嘔者復內半夏以去其水

服苓甘五味姜細後欬滿卽止設其更覺復渴衝氣復發者以細辛乾薑本爲熱藥服之熱傷肺津遂當應時作渴津亡燥動風木乃發乃渴反止者此爲支飲內停也支飲格其陽氣法當背胃者胃氣升逆必作嘔吐嘔者復內

半夏以去其水飲而止嘔吐也。

茯苓甘草五味加乾薑細辛半夏湯 百七

茯苓 四兩 甘草 二兩 五味 半斤 乾姜 二兩 細辛 二兩

半夏 半斤

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服。

痰飲咳嗽三十六

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也。

服苓甘五味姜辛半夏後水去喘止其人形腫者此衛氣之鬱宜加杏仁利肺壅而泄衛鬱腫家應內麻黃以泄衛鬱以其人服小青龍後陽隨汗泄手足麻痺故不內之若逆而內之者必手足厥冷所以然者以汗泄血中溫氣其人陰中之陽已虛麻黃復泄其血中之陽氣故也

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯 百八

茯苓 四兩 甘草 三兩 五味子 半斤 乾薑 三兩 細辛 三兩

半夏 半斤 杏仁 半升去皮尖

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三服

痰飲咳嗽三十七

若面熱如醉此爲胃熱上衝薰其面加大黃以利之

服小青龍後其面翕然如醉此胃熱上衝薰蒸其面若服
苓甘五味姜辛杏仁之後此證猶存宜加大黃以利之則
胃熱清矣

苓甘五味加薑辛半杏大黃湯 百九

茯苓 四兩 甘草 三兩 五味子 半升 乾薑 三兩 細辛 三兩

半夏 半升 杏仁 半升 大黃 三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

附方

外臺茯苓散

治心胸中有停痰宿水。自吐出水後。心膈間虛氣滿。不能食。消痰氣。令能食。

茯苓

三兩

人參

三兩

白朮

三兩

枳實

二兩

橘皮

二兩半

生薑

四兩

右六味以水六升煮。取一升八合。分溫三服。如人行九里進之。